



دارای گواهینامه درجه یک عالی اعتبار بخشی ملی و

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت

آموزش به بیمار سقط غیر قانونی



تنظیم و هماهنگی: واحد بهبود کیفیت، آموزش و پژوهش

بیمارستان امام حسین (ع)

مشهد مقدس، خیابان شهید مفتح، خیابان وحید، وحید ۳

تلفن: ۳۲۷۸۷۰۰۱

مراجعه کننده‌ی گرامی در صورت بروز هر گونه سوال و ابهام در رابطه با آموزش‌ها می‌توانید با شماره تلفن ۳۲۷۸۷۶۶۵ "کلینیک پرستاری آموزش سلامت" تماس بگیرید. کارشناسان ما در این کلینیک روزهای اداری از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ پاسخگوی شما می‌باشند.

شماره بازنگری: ۰

شماره سند: ۷۵۳۰ ف

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ تاریخ آخرین ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۵

مددجویان عزیز لازم به ذکر است:

در صورت وجود هرگونه ناهنجاری در جنین و یا بیماری در مادر که نیازمند سقط قانونی است در سن بارداری زیر ۱۸ هفته باید به پزشکی قانونی مراجعه نمایید و مجوزهای قانونی را اخذ نمایید، سپس با در دست داشتن مدارک مربوطه به پزشک و یا بیمارستان مراجعه نمایید.



مراجعه‌کننده‌ی گرامی در صورت نیاز می‌توانید سایر مطالب آموزشی مورد نیاز خود را از طریق اسکن کد QR و یا ورود به لینک زیر مشاهده نمایید.

<https://pamphlet.imhh.ir/IA/>



منبع:

- Medlineplus

عوارض سقط غیرقانونی:

سقط‌های غیر قانونی اغلب با خونریزی شدید و عفونت و شوک عفونی همراه است و در موارد قابل توجهی منجر به عوارض جبران‌ناپذیری برای مادر و یا حتی خانواده می‌شود. احتمال ناباروری و سقط‌های مکرر پس از سقط غیرقانونی بسیار افزایش می‌یابد.

- افسردگی
- احساس خشم
- اختلالات عصبی
- بی‌خوابی و خواب پریشان
- مشکلات اضطرابی
- احساس گوشه‌گیری
- و احساس گناه و پشیمانی نیز از سایر پیامدهای سقط غیر قانونی جنین است.

بسیاری از زنان به دلیل باورهای غلط در مورد بارداری مانند (عادت ماهانه‌ی من منظم است پس به راحتی و به سرعت باردار می‌شوم یا می‌توانم تا چهل سالگی صبر کنم و بعد باردار شوم و ...) از اقدام به بارداری در سنین مناسب پیشگیری می‌کنند، درحالی که واقعیت این است که قدرت باروری زنان با افزایش سن به ویژه پس از ۴۵ سالگی به طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

افزایش سن زن، تعداد تخمک‌های تولید شده و کیفیت آن را کاهش می‌دهد و سطح هورمون‌های زنانه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث نامنظم شدن تخمک‌گذاری و کاهش قدرت باروری می‌شود.

ممدجوی گرامی این برگه آموزشی حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در ارتباط با سقط غیر قانونی می باشد. امیدواریم نکات ذکر شده پاسخگوی سوالات شما باشد.

سقط جنین چیست؟

سقط جنین به معنی از دست رفتن محصول حاملگی (جنین) قبل از هفته ۲۰ حاملگی است. در صورتی که جنین سقط شود، دسترسی به مراقبت‌های ایمن برای مادر، جزء ضروری مراقبت‌های بهداشتی است. متأسفانه بخش بزرگی از سقط جنین‌ها ناامن و غیر قانونی می‌باشد و این سقط‌ها در بروز عوارض برای مادران بسیار تاثیرگذار هستند.

سقط غیرایمن یا غیر قانونی:

وقتی سقط جنین بدون دستور مکتوب پزشکی قانونی و یا توسط افرادی که مهارت‌های لازم را ندارند یا از تکنیک‌های خطرناک استفاده می‌کنند و یا در محیطی که حداقل استانداردهای پزشکی را رعایت نمی‌کند انجام شود، سقط غیرایمن یا غیر قانونی رخ داده است.

سقط جنین ناایمن هزینه‌های اقتصادی، قانونی و حتی جانی زیادی برای مادر دارد زیرا این روش معمولاً بدون اجازه‌ی قانون و توسط افراد خلافکار و فاقد مهارت و به طور ناقص انجام شده و خطرات احتمالی به دنبال آن، نیاز به انجام اقدامات سریع در بیمارستان را ایجاد می‌کند.



عوارض سقط جنین غیر قانونی چیست؟

وقتی سقط به صورت غیرقانونی و توسط افراد فاقد علم و مهارت و یا در محیط‌های آلوده انجام می‌گیرد، قطعاً عوارضی به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:

- نارسایی کلیه
- خونریزی شدید
- کم خونی
- مرگ ومیر
- چسبندگی رحم
- هیستریکتومی (خارج کردن رحم)
- سقط عفونی (خطرناک‌ترین عارضه)

سقط عفونی چیست ؟

سقط عفونی یکی از خطرناک‌ترین عوارض سقط غیر قانونی است. وقتی که سقط توسط افراد غیرمتخصص و یا در مکان‌های غیر بهداشتی و با دستکاری رحم انجام شود خطر سقط عفونی افزایش می‌یابد. در این مورد کیسه آب جنین سوراخ می‌شود و میکروب عفونت را وارد رحم می‌شود.

سقط عفونی تهدید کننده جان مادر است و با وارد شدن عفونت به داخل خون خطرات زیادی برای مادر ایجاد می‌کند.



روش های غیرقانونی سقط ممکن است به صورت دارویی و یا با استفاده از ابزار باشد، که هر کدام عوارض مخصوص به خود را دارد:

استفاده از دارو ممکن است سبب مسمومیت و بروز علایمی همچون:

- تب بالا
- لرز
- درد شکم
- استفراغ
- اسهال
- لرزش
- بی قراری
- گیجی
- بی‌قراری و کمبود اکسیژن در خون
- و افت فشارخون شود.
- استفاده از ابزار نیز ممکن است سبب:
- عفونت رحمی
- خونریزی غیرقابل کنترل
- و پارگی رحم گردد.

مادر گرامی دقت کنید:

برای اینکه سقط جنین ناایمن نداشته باشیم باید از بارداری ناخواسته پیشگیری کنیم. برای این منظور بهترین روش از خدمات مشاوره تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری مراکز بهداشت یا مشورت با پزشکان و یا ماماها استفاده کنیم.